

DKXXXXXXXXXX

Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

Indånding: Bring personen ud i frisk luft (undgå afkøling).

Hudkontakt: Fjern straks forurenede tøj. Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe.

Øjenkontakt: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Forsæt skylning (P305+351+338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+313).

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt med vand. Fremkald ikke opkastning. Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Generelt: Ved symptomer på forgiftning og/eller vedvarende irritation af hud, øjne eller åndedræt søges straks læge.

BRUGSANVISNING

Anvendelsesområde:

Merit®Turf anvendes på græsarealer som angribes af oldenborrens, gåsebillens og stankelbenets larver, som f.eks. idrætsanlæg og golfbaners fairways og semirough.

Virkemekanisme

Merit®Turf er et systemisk virkende insektmiddel, der virker som kontakt- og ædegift. Merit®Turf har en god fordelingssevne og virker i en relativt lang periode overfor angreb af larver.

Anvendelsestidspunkt:

Imod gåsebillens og oldenborrens larver: Behandlingen foretages i billens æglægningsperiode. Det optimale tidspunkt er i begyndelsen til midten af juni måned, men behandlingen kan udføres frem til begyndelsen af juli med godt resultat.

Imod stankelbenets larver: Stankelben sværmer i midten af september og larverne klækkes efter 14 dage. Behandlingen foretages når larverne klækkes. Det optimale behandlingstidspunkt er i slutningen af september til slutningen af oktober.

Merit® Turf har ingen specielle temperaturkrav, men det kan anbefales at udbringe Merit® Turf på fugtig græs, eller i forbindelse med nedbør.

Dosering:

Doseringen er 30 kg Merit®Turf pr. hektar efterfulgt af regn/vanding. Kun en behandling pr. år.

Skadegærer	Dosering	Behandlingstidspunkt
Larver af gåsebillen og oldenborre	30 kg pr. hektar	Juni – juli På græsarealer med tæt og veletableret græsbestand. Det optimale tidspunkt er i begyndelsen til midten af juni måned, men behandlingen kan udføres frem til begyndelsen af juli med godt resultat.
Larver af stankelben	30 kg pr. hektar	September - oktober Stankelben sværmer i midten af september og larverne klækkes efter 14 dage. Det optimale behandlingstidspunkt er i slutningen af september til slutningen af oktober.

Udbringningsmetode:

Granulatet fordeles jævnt på arealet med f.eks. gødningsspreder, såmaskine eller andet egnet udbringningsudstyr. Produktet kan eventuelt oplandes i tørt sand eller topdressing inden udbringning, hvis udbringningsudstyret kræver højere volumen for at fungere optimalt. Behandlingen foretages lige før regnvej. Der skal tilføres 5-10 mm vand (5-10 L/m²), så granulatet bliver opløst, og aktivstoffet bringes i kontakt med græssets rødder og det øverste jordlag. OBS: Vandet må ikke løbe af jorden.

Beskyttelsesforanstaltninger:

Ved håndtering og udbringning af plantebeskyttelsesmidler anvendes altid egnet værnemidler, såsom egnede gummihandsker, arbejdstøj, støvler og beskyttelsesbriller.

Resistensdannelse

Gentagen anvendelse af samme middel eller middel med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum.

Ansvar:

Bayer CropScience fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet.

Rengøring af udbringningsudstyr

Efter endt udbringning skal udbringningsudstyret rengøres på en vaskeplads. Et uvasket udbringningsudstyr skal placeres under tag. Vaskevandet kan opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. Den maksimale tilladte dosering, som er anført på etiketten af de anvendte midler, må ikke herved overskrides på markniveau. Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). **I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1355 af 14. december 2012.**

Bortskaffelse af rester og tom emballage:

• Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.

Bemærk

- Anvend ikke produktet når der er blomstrende vegetation græsset. Slå græsset før udbringning og regelmæssigt efter.
- Gåsebillens larver er kun et problem på lette jordtyper.
- Forsøg har vist, at skadetærsklen på tæt og veletableret græs er cirka 60 larver pr. m². Denne skadetærskel vil være noget lavere på dårligt etablerede græsarealer.
- Larverne opholder sig 2-5 cm under jordoverfladen og lever af græssets rødder, hvilket vil kunne ses som mistrivsel og gulfarvning af græsset. Den store synlige skade som observeres i september/oktober skyldes, at de store fugle (skader, krager og råger) i deres søgen efter larverne får græstøppet op.



ADVARSEL

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i græsarealer.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1).

Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Deklaration:

Insektmiddel nr. 18-485

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Indhold: Imidacloprid 5 g/kg (0,5% w/w)

Netto: 5 kg

Midlet er et granulat.

DKXXXXXXXXXX

Bayer

Bayer A/S
Bayer CropScience
Arne Jacobsens Allé 13
2300 København S
Tlf. 45 23 50 00
www.bayer-es.dk



Opbevares tørt og køligt.
Produktionsdato: Produktet er ved korrekt opbevaring holdbart i mindst 2 år efter produktionsdatoen. Dato påtrykt emballagen.
Batch nr. påtrykt emballagen.

UN 3077

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (IMIDACLOPRID MIXTURE)

ARTICLE xxxxxxxx



Merit® TURF

INSEKTMIDDEL

- ✓ Effektivt
- ✓ Langtidsvirkende
- ✓ Æn behandling pr. sæson

Insektmiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i græsarealer.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Nettoindhold:

1 x 5 kg e

Systemisk insekticid

